

ETIKETA

Pomocný prostředek ochrany rostlin

Obchodní název : **IT – ECOLURE TUBUS**

Feromonový dispenzor určený k monitorování lýkožrouta smrkového (*Ips typographus* L.) při ochraně lesních porostů.

Účinné látky a jejich obsah v prostředku :

Feromonová směs, obsahující

1. (S)-cis-verbenol 3,0 % hm.
2. alkoholy – rozpouštědla 85,2 % hm.
3. synergické komponenty.....11,8 % hm.

Evidenční číslo prostředku : 1610 – 2C

Držitel osvědčení o evidenci : FYTOFARM Group s.r.o. Mělník

Distributor v ČR : Fytofarm CZ s.r.o. Mělník, Dlouhá1360
Mělník 276 01

Výrobce prostředku : FYTOFARM Group s.r.o.Dlouhá 1360/28
276 01 Mělník, tel / fax: 315 671168



Dráždivý

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Prostředek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a pryžové holínky.

Dodržujte pokyny, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

Riziko vyplývající z použití pomocného prostředku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci a při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro včely a pro populace všech druhů užitečných členovců.

První pomoc :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.

Balení a obsah : 5 ks alufanových sáčků v PE sáčcích nebo jednotlivé kusy dle dohody

Datum výroby :

Číslo šarže :

Doba použití :

Minimálně jeden rok od data výroby, při dodržení podmínek správného skladování.

Návod k použití :

Rozsah evidence a použití:

Plodina	Škodlivý činitel	Účel použití	Ochranná lhůta
Lesní porosty, smrk	Lýkožrout smrkový (<i>Ips typographus</i>)	Monitoring, signalizace náletu,	AT

Otevřete hermeticky uzavřený nepropustný alufanový obal. Konstrukčně zcela nový odparník, kde účinná směs je uzavřená v zásobníku z průsvitné speciální plastikové tuby s volnou náplní. Přípravek se po vyjmutí z hermeticky uzavřeného obalu bez další úpravy ihned vyvěsí pomocí příchytky do lapače. Celosezónní účinnost 18 – 20 týdnů.

Termín ošetření: duben až září, proti 1. - 3. generaci, těsně před začátkem rojení

Používají se :

V kombinaci s umělými selektivními lapači např. ECOTRAP, THEYSON atd.

V kombinaci s odvětvenými lapáky nebo jejich výřezy, či sekcemi.

- na zvýšení vábivosti chemicky neošetřených lapáků v smrkových porostech oslabených průmyslovými imisemi, prísuškem, či jinými činiteli.
- na zabránění rozptýlenému napadení nebo vzniku rozsevů ve smrkových porostech s polomy nebo vývraty.
- při aplikaci metody otrávených lapáků ošetřených insekticidní suspenzí.

Umístění lapačů odparníků : Upravuje ON 482711 (obecně doporučujeme)

- bezpečnostní vzdálenost od nejbližšího zdravého smrku nemá klesnout pod 10 m a neměla by překročit 25 m.
- optimální nejmenší vzdálenost mezi lapači se doporučuje 10 m, při vyšších populačních hustotách je výhodnější vzdálenost 5 m.
- při kalamitním stavu se doporučuje umístit lapače ve skupinách v rozestupech 1m.
- sběrné zařízení lapače Ecotrap by mělo být 1 m nad zemí.
- umístěte minimálně jeden lapač na 5 ha porostu (monitoring).

Skladování :

Odparníky Ecolure skladujte v původních nepoškozených obalech, v suchých a uzamčených skladech odděleně od potravin, hnojiv, krmiv, chemikálií, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě -5 °C až + 10 °C.

Způsob likvidace:

Použité, resp. nefunkční odparníky spolu s obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.